

## 膠原病リウマチ科 診療実績

### 2012年度

・外来：新患20～30名／月、再診500名／月

・関節リウマチに対する薬剤使用率

メトトレキサート72.8%

プレドニゾロン28.6%

サラゾスルファピリジン8.7%

ブシラミン5.7%

タクロリムス10.5%

ミゾリピン2.2%

生物学的製剤(インフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブ、アクテムラ、アバタセプト、ゴリムマブ、セルトリズマブ)30.1%

・関節リウマチ治療成績(DAS28ESR)

	臨床的寛解	低疾患活動性の割合
抗リウマチ薬だけの場合	47.3%	66.6%
生物学的製剤使用の場合	66.7%	92.6%

### 2013年度

・外来：新患20名前後／月、再診500名／月

・関節リウマチに対する薬剤使用率

メトトレキサート72.0%

プレドニゾロン19.6%

サラゾスルファピリジン9.1%

ブシラミン5.7%

タクロリムス8.3%

生物学的製剤(インフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブ、ゴリムマブ、セルトリズマブ、トシリズマブ、アバタセプト)31.3%

・関節リウマチ治療成績(DAS28ESR)

	臨床的寛解	低疾患活動性の割合
抗リウマチ薬だけの場合	49.5%	69.0%
生物学的製剤使用の場合	62.0%	84.5%

### 2014年度

・外来：新患20名前後／月、再診500名／月

・関節リウマチに対する薬剤使用率

メトトレキサート72.5%

プレドニゾロン19.4%

サラゾスルファピリジン8.9%

ブシラミン5.3%

タクロリムス8.6%

生物学的製剤(インフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブ、ゴリムマブ、セルトリズマブ、トシリズマブ、アバタセプト)30.2%

・関節リウマチ治療成績(DAS28ESR)

	臨床的寛解	低疾患活動性の割合
抗リウマチ薬だけの場合	48.8%	65.4%
生物学的製剤使用の場合	65.5%	82.0%

### 2015年度

・外来：新患平均16.7名／月、再診平均585名／月

・関節リウマチに対する薬剤使用率

メトトレキサート71.5%

プレドニゾロン21.5%

サラゾスルファピリジン8.1%

ブシラミン4.8%

タクロリムス7.5%

生物学的製剤(インフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブ、ゴリムマブ、セルトリズマブ、トシリズマブ、アバタセプト)32.7%

・関節リウマチ治療成績(DAS28ESR)

	臨床的寛解	低疾患活動性の割合
抗リウマチ薬だけの場合	51.8%	67.9%
生物学的製剤使用の場合	65.4%	88.4%